



Vous pouvez également retrouver ces informations sur le site Internet www.educationcoeur.be

N'hésitez pas à nous contacter au 02/764.61.11 en cas d'interrogation

Consignes à respecter avant votre hospitalisation pour une opération de valve cardiaque

1. Les médicaments suivants sont à arrêter **5 jours** avant votre hospitalisation :

Ticlid®, Ticlopidine, Plavix®, Clopidogrel,

Les médicaments qui contiennent de l'acide acétylsalicylique : Aspirine, Aspégic, ASA, Alka Seltzer, Cardégic, Cardiphar, Sédergine, Acentérine, Asaflow, Cardioaspirine.

2. Les médicaments du diabète à base de Metformine sont à arrêter **3 jours** avant l'hospitalisation : Glucophage, Metformine, Metformax, Eucréas, Janumet, Glucovance.

En dehors des médicaments repris dans cette liste, poursuivez toute autre médication. En cas de doute, appelez-nous.

3. En cas de prise de Sintrom :

- en accord avec votre médecin traitant, arrêt du Sintrom **3 jours** avant l'hospitalisation avec relais par injections de Fraxiparine ou de Clexane
- en cas de poursuite du Sintrom jusqu'à la veille de votre hospitalisation, votre intervention sera retardée.

4. **Si vous êtes porteur d'un stent** placé durant l'année précédant la date opératoire, contactez-nous au 02/764.61.11.

5. La **diminution de la consommation** de tabac en pré-opératoire est impérative pour la bonne évolution de votre état de santé en post-opératoire. Lors de votre hospitalisation, nous pourrions vous aider à arrêter le tabac.

6. Votre consommation d'alcool doit être réduite à moins de 3 verres par jour pendant la semaine qui précède l'intervention.

7. Vous pouvez toujours contacter le 02/764.61.11 si vous avez des questions. Elles seront relayées auprès de l'anesthésiste

Merci pour votre collaboration
L'anesthésiste responsable
Docteur M. Van Dyck

